

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ**

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
**ГЛИЦИФОН®**

**Регистрационный номер:** ЛП-000957

**Торговое наименование лекарственного препарата:** Глицифон®

**Международное непатентованное наименование или химическое (группировочное) наименование:** диглицидил метилфосфонат

**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения

**Состав на 100 г мази**

*Действующее вещество:* диглицидил метилфосфонат (глицифон) - 30 г.

*Вспомогательные вещества:* вазелин, ланолин безводный.

**Описание**

Мазь от желтого до желто-коричневого или зеленовато-коричневого цвета со специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** Противоопухолевое средство

**Код АТХ:** L01

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Оказывает цитостатическое, противоопухолевое и противомикробное действие. Проявляет контактное действие при опухолях и предопухолевых заболеваниях кожи, избирательно угнетает метаболизм в бластоматозно измененных клетках, что объясняется антимиотическим действием, особенно выраженным в кислой среде опухолевой ткани.

Глицифон уменьшает пролиферативный пул, ингибирует синтез ДНК, влияет на все периоды митотического цикла, вызывая блоки различной глубины и длительности и в наибольшей степени задерживая клетки в фазах G1 и M, а также G2.

На культурах тканей препарат оказывает избирательное цитотоксическое действие на опухолевые клетки, вызывая глубокие дистрофические изменения в них, сопровождающиеся уменьшением содержания нуклеиновых кислот и подавлением активности окислительно-восстановительных ферментов, а также подавляя вступление клеток в митоз и индуцируя различные аномалии их деления.

**Фармакокинетика**

Фармакокинетика не изучалась.

**Показания к применению**

- Плоскоклеточный рак кожи 1 стадии;
- Базалиомы (в т.ч. рецидивы после хирургического или лучевого лечения);
- Болезнь Бовена;
- Сенильный кератоз.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст.

**С осторожностью**

С осторожностью наносить препарат на участки кожи, расположенные рядом с периорбитальной областью. Избегать попадание препарата в глаза.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

**Способ применения и дозы**

Наружно. Кожу в зоне роста опухоли или кератоза протирают тампоном, смоченным в спирте, затем накладывают 0,8-2 г мази (в зависимости от размера очага) под марлевую салфетку и фиксируют пластырем. При каждой перевязке очаг и окружающую кожу протирают спиртом и удаляют некротизированную ткань. Мазь накладывают один раз в сутки (до 24 ч) до полного разрушения опухолевой ткани.

Продолжительность лечения определяется локализацией и размером очага. При лечении рецидивирующих опухолей, мелкоузловых форм базалиом в области лба и носа делают 15-20 аппликаций; при язвенных формах, при базалиомах поверхностного типа и болезни Бовена 10-15, при сенильных кератозах 5-10 аппликаций. После завершения лечения на образовавшийся дефект ежедневно накладывают асептические повязки с регенерирующими средствами до полного рубцевания.

Завершенность лечения устанавливается цитологическим исследованием.

**Побочное действие**

Отек периорбитальной области, гиперемия, зуд и боль в месте нанесения.

**Передозировка**

Случаев передозировки мази Глицифон<sup>®</sup> до настоящего времени не выявлено. При случайном попадании лекарственного препарата внутрь, следует провести промывание желудка.

Лечение: симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Взаимодействия мази Глицифон<sup>®</sup> с другими лекарственными средствами не выявлено.